

ダコニール 1000

みなさんの「あったらいいな」に応えました



ねぎ
ペーパーポット、セル成型育苗トレイ処理
使用方法

ごぼう
うどんこ病
作物追加

レタス
灰色かび病
病害追加

きく
白さび病、斑点病、うどんこ病
病害追加

いちじく
さび病
病害追加


あしたば
黒枯病
作物追加

花き類、観葉植物
(チューリップ、りんどうを除く)
斑点病
病害追加

ばら、ゆり
斑点病
病害追加

しゃくやく(薬用)
15回以内(1年間に3回以内)
使用回数

病害の同時防除&耐性菌対策に



適用 拡大 70種類以上の作物、およそ180種類の病害に登録!

【土壌灌注剤あるいは種子消毒剤としての適用病害と使用方法】

2018年10月末現在

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数*	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数*
稲(育苗)	苗木枯病 (リゾニア菌)	500~1000	育苗箱(30x60x3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り500ml	は種時から緑化期 但し、は種14日後まで	2回	土壌灌注	2回
		1000~2000	育苗箱(30x60x3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り1ℓ				
きゅうり	苗木枯病 (リゾクニア菌)	1000	3ℓ/m ²	は種時又は活着後 但し、定植14日後まで	1回	土壌灌注	10回(土壌灌注:2回、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射:合計8回) 6回(土壌灌注:2回、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射:合計4回) 5回(土壌灌注:2回、散布:3回) 3回(土壌灌注:1回、散布:2回) 1回
トマト	ビッグベイン病		1.5~3ℓ/m ²	収穫42日前まで			
レタス	根こぶ病		3ℓ/m ²	定植時			
ブロッコリー	立枯病		3ℓ/m ²	は種時			
みずな	立枯病		3ℓ/m ²	は種時			
ねぎ	苗木枯病 (リゾクニア菌)	500	0.5ℓ/m ² セル成型育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30x60cm、使用土壌約5ℓ) 当り0.5ℓ	出芽揃い後 (出芽3日後から10日後まで)	1回	土壌灌注	4回(土壌灌注:1回、散布:3回)
わけぎ			0.5ℓ/m ²			吹き付け処理 (種子消毒機使用)	3回(土壌灌注:1回、散布:2回)
にんじん	黒葉枯病	12	乾燥種子1kg当り60ml	は種前			5回(種子への吹き付け処理:1回)

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示しています。

